

Einreise

Impfungen / Impfausweis:

- Wichtig sind der Impfausweis und eine Bestätigung beide Corona-Schutzimpfungen erhalten zu haben oder eine Corona-Erkrankung [Covid 19] überstanden zu haben.

Zusätzlich muss ein höchstens 72 Stunden vor Reisebeginn vorgenommener negativer PCR-Test vorliegen. Das Ergebnis muss elektronisch oder in Papierform möglichst in der Landessprache [Spanisch, Französisch, am Besten noch zusätzlich Englisch] vorliegen. Folgende Angaben müssen enthalten sein:

- *Name des Reisenden*
- *Pass- oder Personalausweisnummer*
- *Datum der Testabnahme*
- *Kontaktdaten des Labors*
- *angewandtes Testverfahren*
- *negatives Testergebnis*

Ebenso ist für Frankreich eine schriftliche Erklärung der Symptombefreiheit erforderlich. Das Formular für die schriftliche Erklärung ist vorgegeben und wird Dir von mir bereitgestellt.

Für Spanien ist eine elektronische Voranmeldung beim Gesundheitsamt erforderlich. Diese ist auch als Gruppenvoranmeldung möglich. Ich werde diese für die ganze Gruppe ausfüllen. Daraufhin erhält jede*r Teilnehmer*in einen QR-Code, mit dem sie/er sich bei der Einreise hinsichtlich des Gesundheitsstatus ausweisen kann. Dies gilt zwar in erster Linie für Flugpassagiere, aber derzeit auch für die Einreise zu Land und zu Wasser. ***Dies ist nur derzeit gültig. Wie dies im Sommer 2022 sein wird, das kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden. Auf jeden Fall wirst Du rechtzeitig darüber informiert.***

- Impfungen sind außer Corona keine vorgeschrieben, aber besonders bei Kindern empfiehlt das Robert-Koch-Institut folgende vorbeugende Impfungen:
 - Diphtherie (D/d)
 - Haemophilus influenzae Typ b (Hib)
Hierzu zählen Erkrankungen, wie die Entzündungen von Hirnhaut, Nieren, Kehldeckel, Lungen oder Knochen, die durch Bakterien vom Haemophilus influenzae Typ b (Hib) verursacht werden.
 - Hepatitis B (HB) / in Spanien speziell auch: Hepatitis A
 - HPV
(Humane Papillomaviren - eine neue Standardimpfung für Mädchen)
 - Masern, Mumps, Röteln (MMR)
 - Meningokokken
 - Pertussis (aP/ap) (Keuchhusten)
 - Pneumokokken
 - Poliomyelitis (IPV) (Kinderlähmung)
 - Rotaviren
 - Tetanus (T)
 - Varizellen
 - Influenza (für Erwachsene)

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren					
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–11	12–17	ab 18	ab 60
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f	
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f	
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^a	G3	G4	N	N					
Poliomyelitis		G1	G2 ^a	G3	G4	N	N		A1	ggf. N		
Hepatitis B		G1	G2 ^a	G3	G4	N	N					
Pneumokokken		G1	G2	G3	G4	N						S ^e
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)									
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)		N					
Masern					G1	G2	N					S ^d
Mumps, Röteln					G1	G2	N					
Varizellen					G1	G2	N					
Influenza												S (jährlich)
HPV Humanes Papillomvirus												S ^e

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen, vgl. Tabelle 2

d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff

e Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen

f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.